

Protocolo vacinal para abrigos pós-desastres:

CÃES:

Vacina	Filhote (a partir de 30 dias)	A partir de 4 meses	Revacinação
Puppy e Polivalente (V8 ou V10) Via de administração: Intramuscular	* Dia 0 = 1ª dose: Puppy ** 2ª dose - após 21 dias: Puppy ou Polivalente 3ª dose - após 21 dias: Polivalente 4ª dose - após 21 dias: Polivalente ***	* Dia 0 = entrada 1ª dose: Polivalente 2ª dose - após 21 dias: Polivalente 3ª dose: após 21 dias	Anual (vacinas com Leptospira) e Trianual (vacinas sem Leptospira)
Raiva	Dia 0 - a partir de 16 semanas de vida Dose única	Dia 0 - após 15 dias da polivalente Dose única	Anual
Bordetelose (Intranasal)****	Ideal > 6 semanas de idade Dose única	Dia 0 (entrada) Dose única	Anual para animais em risco
Leishmaniose visceral canina	Dia 0 - a partir de 16 semanas - intervalada em 15 dias das demais vacinas 1 - dose 1 - (120 dias) 2 - dose 2 após 21 dias (141 dias) 3 - dose 3 após 21 dias (162 dias)	Dia 0 - (entrada) intervalada em 15 dias das demais vacinas. 1 - dose 1 2 - dose 2 após 21 dias 3 - dose 3 após 21 dias	Reforço um ano após a primeira dose e anual

GATOS:

Vacina	Filhote	Adulto	Revacinação
Polivalente	* Dia 0 = a partir de quatro semanas de idade 1 - dose 1: Quíntupla ¹ 2 - após 21 dias: Quíntupla ¹ 3 - após 21 dias: Quadrupla	* Dia 0 = entrada 1 - dose 1: Quíntupla ¹ 2 - dose 2: após 21 dias: Quíntupla ¹ 3 - dose 3: após 21 dias	Anual (Quíntupla)
Raiva	Dia 0 (entrada) se > 12 semanas de idade Dose única, após 15 dias da polivalente	Dia 0 - após 15 dias da polivalente Dose única	Anual

OBSERVAÇÕES

* Dia 0 é o momento em que se aplicará a primeira dose da vacina.

** Se no momento da 2ª dose o animal apresentar menos de 12 semanas de vida, aplicar a Puppy. Caso contrário, aplicar a Polivalente.

*** Administrar a última dose de polivalente na 16ª semana de vida.

**** Muito importante realizar o manejo do ambiente

¹ Somente administrar a quíntupla em animais negativos para Felv

Tratamento vermicida - desverminação
Praziquantel + Pamoato de pirantel + Febantel

Doses

Dia 0 - entrada: dose 1
Dose 2 - 1 dia depois
Dose 3 - 1 dia depois

Dose 4 - 15 dias depois (reforço semestral)

Tratamento vermicida - desverminação
Praziquantel + Pamoato de pirantel

Doses

Dia 0 - entrada: dose 1
Dose 2 - 1 dia depois
Dose 3 - 1 dia depois

Dose 4 - 15 dias depois (reforço semestral)

